


NUESTRO PRINCIPAL ÉXITO: UN GRAN EQUIPO HUMANO

Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
Especialista en Anestesiología
Licenciado en medicina y cirugía
Instrumentista, ATS
Ayudantes de anestesia e instrumentación
Uds. Antienvjecimiento y Estética, especialista
Licenciado en Farmacia
Fisioterapeuta
Preparador Físico
Auxiliar de clínica

Dra. Isabel Moreno
Dr. José Ricart
Dra. Marta Ribera
Isabel González
Mar Martínez y M^a Martín
Dra. Francisca Torres
Inmaculada Padilla
M^a Dolores Morales
Carmen García
Genoveva Rodrigo



cirugía de la mama □ ginecomastia



clm CLÍNICA ISABEL MORENO
CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA
MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO

Av. de las Cortes Valencianas, 28 46015 VALENCIA (España) Tel. y Fax: 96 317 37 00 e mail: info@clinicaisabelmoreno.com

clm CLÍNICA ISABEL MORENO
CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA





cirugía de la mama □ ginecomastia

El aumento de tamaño de la región mamaria masculina se denomina Ginecomastia. Lo habitual es que éste desarrollo excesivo se deba tanto a una acumulación de tejido graso en la región, como a un crecimiento de la glándula mamaria. Antes de realizar la intervención, hay que descartar un eventual crecimiento patológico del tejido mamario (por carcinomas, que muy raramente aparecen en la glándula mamaria de los varones).

Se trata de situaciones que suelen provocar complejos a los hombres que las sufren, debido a la apariencia ó sensación psicológica de tener un pecho "poco varonil". El paciente tiende a evitar el uso de prendas ajustadas. También resultan muy molestas y frustrantes las oscilaciones que se producen en las mamas cuando, por ejemplo, se practica deporte (carrera, bicicleta...).

El tratamiento consiste en reseca el tejido graso y el tejido mamario (glándula). Cuando el componente graso es abundante a veces puede ser suficiente con una liposucción.

No obstante, la realidad es que el volumen se debe tanto al tejido graso como a la glándula. Por este motivo, **En CIM - Clínica Isabel Moreno**, la intervención la realizamos a través de una incisión periareolar media, con lo que abordamos la glándula, reseca el botón mamario, para luego realizar un despegamiento de la glándula mamaria en su conjunto y reseca a su vez. Finalmente practicaremos una liposucción para evitar que aparezcan irregularidades.

La intervención es muy bien tolerada con anestesia local más sedación y es importante dejar un drenaje en la zona operatoria y utilizar una faja compresiva durante varios días. Es frecuente la formación de hematomas que desaparecen con el tratamiento adecuado. El paciente se reintegra a su actividad totalmente normal en muy pocos días (de 3 a 7 días).

El resultado es muy bueno. El exceso de volumen ha desaparecido y el paciente recupera la confianza en sí mismo.

Véase también la información presentada para otras cirugías de la mama:

- **Mamoplastia de aumento**
- **Mamoplastia de reducción**
- **Mastopexia**
- **Reconstrucción de mama**

Ficha Técnica Ginecomastia

Tiempo quirúrgico :	1 ó 2 horas
Anestesia:	Local ó General
Hospitalización:	1 ó 2 días ó no requiere
Recuperación.	3 a 7 días
Resultados:	inmediatos