

NUESTRO PRINCIPAL ÉXITO: UN GRAN EQUIPO HUMANO

- Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
- Especialista en Anestesiología
- Licenciado en medicina y cirugía
- Instrumentista, ATS
- Ayudantes de anestesia e instrumentación
- Uds. Antienvjecimiento y Estética, especialista
- Licenciado en Farmacia
- Fisioterapeuta
- Preparador Físico
- Auxiliar de clínica

- Dra. Isabel Moreno
- Dr. José Ricart
- Dra. Marta Ribera
- Isabel González
- Mar Martínez y M^a Martín
- Dra. Francisca Torres
- Inmaculada Padilla
- M^a Dolores Morales
- Carmen García
- Genoveva Rodrigo



cirugía de la mama □ mamoplastia de reducción



CLÍNICA ISABEL MORENO

CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA
MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO

Av. de las Cortes Valencianas, 28 46015 VALENCIA (España) Tel. y Fax: 96 317 37 00 e mail: info@clinicaisabelmoreno.com



CLÍNICA ISABEL MORENO

CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA
MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO






cirugía de la mama □ mamoplastia de reducción

El volumen exagerado de las mamas produce en muchas mujeres problemas de tipo psicológico (inseguridad, insatisfacción....) pero también fisiológicos, como serían los problemas de espalda (lesiones, dolor...) que el exceso de peso conlleva. Pero es que además el concepto social de la estética de la mama va cambiando según la moda: desde la delgadez extrema a la figura curvilínea o incluso hacia la imagen deportiva.

La cirugía de reducción mamaria comenzó a principios de siglo y no ha dejado de evolucionar. Las primeras técnicas consistían en una reducción de volumen sin preocupación por la forma, pero con los métodos quirúrgicos actuales se ha conseguido obtener formas armoniosas a la vez que estables de la mama.



De entre las muchas técnicas aplicadas, **en CIM - Clínica Isabel Moreno** pretendemos conseguir **la forma y volumen adecuados, con una cicatriz mínima**. El marcaje de la mama se hace empleando el Patrón de Wise. Las incisiones se realizan alrededor del borde de la areola y en la vertical inferior, llegando al pliegue inframamario. El resultado final es una pequeña cicatriz alrededor de la areola y una pequeña T invertida en la vertical. La edad de la paciente, el grado de reducción que hayamos practicado, la calidad de la piel..., son factores que influyen en las cicatrices residuales.

El peso y volumen excesivos han desaparecido y con ellos posiblemente los problemas musculares de la espalda. Se ha mejorado la imagen personal y la seguridad en una misma, lo que sin duda se proyectará en nuestro entorno social.

Estas intervenciones duran alrededor de 2 horas y se realizan con anestesia general, por lo que es habitual estar un día en el hospital. Sin embargo, la simplificación y progresiva rapidez en las técnicas aplicadas hacen que a veces la paciente vuelva a casa el mismo día.

Los puntos se retiran entre los 7 y los 10 días, período tras el cual la paciente puede retomar a su actividad normal, sin molestias.

Ficha Técnica Mamoplastia de reducción

Tiempo quirúrgico :	2 horas
Anestesia:	General
Hospitalización:	1 día
Recuperación.	7 a 10 días
Resultados:	inmediato

Véase también la información presentada para otras cirugías de la mama:

- **Mamoplastia de aumento**
- **Mastopexia**
- **Reconstrucción de mama**
- **Ginecomastia (masculina)**